ใบแถลงข่าว
1 กันยายน 2554

ติดต่อ:
ไพศาล สุวรรณวงษ์ (ภาษาไทย): +66-81-824-5434
Dr. Thomas Kerr (English): 081-297-3475; +1-604-314-7817

งานวิจัยชิ้นใหม่ชี้ความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปนโยบายและโครงการลดอันตรายสำหรับผู้ใช้ยาด้วยการฉีดที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย (1 กันยายน 2554) ในวันนี้ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์ โครงการวิจัยสุขภาพในเขตเมือง (Urban Health Research Initiative: UHRI)
ของศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านเอชไอวี/เอดส์แห่งมหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย (British Columbia Centre for Excellence in HIV/AIDS แวนคูเวอร์ แคนาดา) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (กรุงเทพฯ ไทย) เปิดตัวรายงาน
"การลดอันตรายจากการใช้ยาในประเทศไทย: หลักฐานและข้อเสนอแนะจากโครงการวิจัยชุมชนมิตรสัมพันธ์"
งานวิจัยซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสามองค์กรเกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลเป็นเวลาสองปีเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงด้านเอชไอวีกับอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการเอชไอวีและบริการลดอันตรายในบรรดาผู้ใช้ยาด้วยการฉีดและให้ข้อเสนอแนะที่มีหลักฐานสนับสนุนเพื่อเรียกร้องให้ขยายโครงการลดอันตรายในประเทศไทย

"ประเทศไทยขาดแคลนข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีคุณภาพเกี่ยวกับอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการดูแลด้านเอชไอวีและบริการลดอันตรายสำหรับผู้ใช้ยาด้วยการฉีด และเราต้องการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะจากมุมมองของผู้กำหนดนโยบาย รายงานวิจัยของเราชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความจำเป็นที่จะต้องขยายโครงการลดอันตรายในประเทศไทย" นายไพศาล สุวรรณวงศ์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์ ซึ่งให้บริการโดยตรงต่อผู้ใช้ยาด้วยการฉีดกล่าว

ในปัจจุบัน โครงการวิจัยชุมชนมิตรสัมพันธ์อยู่ในช่วงเก็บข้อมูลเป็นปีที่สาม
นับเป็นงานวิจัยที่โดดเด่นและเป็นการทำวิจัยด้านสาธารณสุขโดยเพื่อนผู้ใช้ยาเอง
ทั้งนี้เพื่อสำรวจประสบการณ์ของผู้ใช้ยาด้วยการฉีดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ระบบยุติธรรมทางอาญา รูปแบบการใช้ยา และพฤติกรรมเสี่ยงต่อเอชไอวี
ข้อค้นพบสำคัญประกอบด้วยความเสี่ยงจากการน็อกยาจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราการแลกเปลี่ยนใช้เข็มฉีดยาที่สูง เพราะผู้ใช้ยาด้วยการฉีดประสบปัญหาในการเข้าถึงเข็มฉีดยาสะอาด นอกจากนั้น
งานศึกษาหลายชิ้นชี้ให้เห็นโทษของการเน้นการแก้ปัญหาด้วยระบบยุติธรรมทางอาญา อย่างเช่น งานศึกษาชิ้นหนึ่งชี้ให้เห็นว่า 48% ของผู้ใช้ยาด้วยการฉีดในพื้นที่ระบุว่าเคยถูกตำรวจยัดยา นอกจากนั้น 78% ของผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่าเคยมีประวัติต้องขัง และบุคคลเหล่านี้มีแนวโน้มจะเคยเข้ารับการบังคับบำบัดมากกว่าผู้ใช้ยาด้วยการฉีดทั่วไปเป็นสองเท่า
และมีแนวโน้มจะแลกเปลี่ยนใช้เข็มฉีดยามากกว่าผู้ที่ไม่เคยอยู่ในเรือนจำเป็นสองเท่า
ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทยประกอบด้วยการพัฒนากรอบการควบคุมการใช้ยาในทางเลือกอย่างเร่งด่วน
โดยให้ความสำคัญในเบื้องต้นกับข้อกังวลด้านสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน

การจัดอบรมการลดอันตรายและสิทธิมนุษยชนให้กับเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายและอัยการ
และการให้บริการลดอันตรายอย่างครบวงจรในสถานกักตัวของตำรวจและเรือนจำ

นายแพทย์โธมัส เคอร์ (Thomas Kerr) รองศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยบริติสโคลัมเบีย
และนักวิจัยหลักของงานวิจัยครั้งนี้ให้ความเห็นต่อข้อค้นพบของรายงานว่า “หลักฐานที่ได้จากการทำวิจัยครั้งนี้มีความชัดเจน
ผู้ใช้ยาด้วยการฉีดในประเทศไทยยังคงประสบปัญหาป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ในอัตราสูงต่อไป
ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าในประเทศไทยไม่มีการนำโครงการลดอันตราย อย่างเช่น
โครงการแจกเข็มฉีดยามาใช้อย่างกว้างขวาง ทั้ง ๆ ที่เป็นโครงการที่ทางองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าควรใช้
และมีการพิสูจน์มาแล้วว่าได้ผล ช่องว่างเช่นนี้ รวมทั้งการพึ่งพามาตรการแก้ปัญหาด้วยระบบยุติธรรมทางอาญาที่ไม่เป็นผล
เป็นเหตุให้ประเทศไทยไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในบรรดาผู้ใช้ยาด้วยการฉีด
โชคร้ายที่การไม่หาทางออกส่งผลให้ต้องมีผู้ทนทุกข์ทรมานอย่างมากจากโรคที่ป้องกันได้
รวมทั้งการละเมิดสิทธิมนุษยชนและต้นทุนที่มองไม่เห็นที่เกิดขึ้นต่อสาธารณะ
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแก้ปัญหาอย่างเป็นผล”

ในช่วงกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา ผู้ใช้ยาด้วยการฉีดในไทยมีอัตราชุกของการติดเชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบซีค่อนข้างสูง
การปราบปรามของตำรวจที่รุนแรงและต่อเนื่องที่กระทำกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยา
ประกอบกับการพึ่งพาการจับกุมคุมขังและการควบคุมตัวและการ “บำบัด” แบบบังคับที่ไม่เป็นผลจนมากเกินไป
เป็นเหตุนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้ยาด้วยการฉีดอย่างสม่ำเสมอ
และเกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบซีเพิ่มขึ้น

แครีน แคปแพลน ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและการพัฒนาของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์
และผู้ร่วมวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ให้ความเห็นต่อข้อเสนอแนะในรายงานว่า
“หลักฐานที่มีการสรุปในรายงานชี้ให้เห็นทางแก้ปัญหา เราได้นำเสนอข้อเสนอแนะเหล่านี้ต่อรัฐบาลไทย องค์การสหประชาชาติ
และแหล่งทุนสากลอื่น ๆ มาแล้ว
โดยภาพรวมข้อเสนอแนะเหล่านี้เรียกร้องให้นำโครงการลดอันตรายที่มีหลักฐานสนับสนุนมาใช้อย่างเร่งด่วน
ให้มีกรอบกฎหมายควบคุมในทางเลือกโดยลดการเอาผิดทางอาญาต่อผู้ใช้ยาผิดกฎหมาย
และมีการปฏิรูปการปฏิบัติของตำรวจ มาตรการเหล่านี้มีการนำไปใช้จนประสบความสำเร็จในหลายพื้นที่
สืบเนื่องจากปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ยาด้วยการฉีดในประเทศไทย เราจำเป็นต้องมีทิศทางใหม่ ๆ
การแก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างที่เป็นอยู่จะไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย และเป็นเรื่องไม่อาจยอมรับได้”

การเปิดตัวรายงานและการอภิปรายจะมีขึ้นในเวลา 9.00 น. ที่ห้อง “Bualuang Innovation”
ห้องเรียนสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 14 อาคารจามจุรีสแควร์
(ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330) หลังจากการนำเสนอรายงาน จะเป็นอภิปรายของเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และองค์การสหประชาชาติ
ซึ่งจะให้ความเห็นต่อข้อเสนอแนะด้านนโยบายเนื่องมาจากข้อค้นพบในรายงาน

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายงานทั้งภาษาไทยและอังกฤษได้ที่ www.ttag.info และ http://uhri.cfenet.ubc.ca/index.php.