

EXEMPLE D'ORDONNANCES D'UN PRESCRIPTEUR

Ceci est un exemple d'une ordonnance préimprimée pouvant être utilisée dans la prestation d'un TAOi.

Étiquette d'identification

Date et heure	ORDONNANCE DE TITRATION POUR L'HYDROMORPHONE À FORTE DOSE (les éléments avec une case doivent être cochés pour être prescrits)
	<p>Ces ordonnances sont destinées aux patients qui commencent un traitement par HYDROmorphone.</p> <p>INDICATION : Trouble lié à l'usage d'opioïdes</p> <p>MÉDICAMENT : HYDROmorphone injectable 50mg/ml pour les ordonnances suivantes pour TOUTES les voies d'administration (IM/IV)</p> <p>Un professionnel de la santé qualifié doit évaluer les signes et les symptômes de sédation et de sevrage d'opioïdes avant et après chaque dose au moyen de l'échelle de sédation Pasero. Si le résultat se situe au niveau 3 ou 4, le prescripteur doit être avisé immédiatement et la dose suivante doit être suspendue.</p> <p><input type="checkbox"/> Un professionnel de la santé qualifié doit évaluer les signes et les symptômes de consommation de stimulants avant chaque dose et aviser le prescripteur si les symptômes suivants sont observés : _____</p> <p><input type="checkbox"/> Un professionnel de la santé qualifié doit évaluer la consommation d'alcool avec un alcootest avant chaque dose. Suspendre la dose et aviser le prescripteur si le résultat de la lecture de l'alcootest est le suivant : _____</p> <ul style="list-style-type: none"> • Test rapide de dépistage de drogue dans l'urine PRN • Alcootest PRN • Le professionnel de la santé qualifié doit aviser le prescripteur si l'usager manque deux séances ou plus ou refuse la deuxième dose. • Le professionnel de la santé qualifié doit informer le prescripteur de la titration avant 15 h le jour 2 afin que le prescripteur puisse rédiger une ordonnance de dose d'entretien. • Arrondir toutes les doses JUSQU'À 5mg près. <p>Jour 1, séance 1 :</p> <p>Dose 1 : HYDROmorphone 10mg (dix milligrammes) IV/IM pour autoadministration x 1 dose Surveiller les signes et les symptômes d'intoxication pendant 15 minutes après la dose</p> <p>Dose 2 : HYDROmorphone 10mg (dix milligrammes) IV/IM pour autoadministration x 1 dose Surveiller les signes et les symptômes d'intoxication pendant 15 minutes après la dose Le professionnel de la santé qualifié doit aviser l'usager de l'heure de retour pour la séance 2</p>

CECI EST UN EXEMPLE D'ORDONNANCE PRÉIMPRIMÉE ADAPTÉE DE LA CLINIQUE CROSSTOWN DE VANCOUVER, C.-B.
 CE FORMULAIRE N'EST PAS DESTINÉ À UN USAGE CLINIQUE.

Ne pas dépasser 20mg (vingt milligrammes) d'hydromorphone IM/IV pour la séance 1 du jour 1

Jour 1, séance 2 :

Dose 1 : HYDROmorphone 20mg (vingt milligrammes) IV/IM pour autoadministration x 1 dose
Surveiller les signes et les symptômes d'intoxication pendant 15 minutes après la dose

Dose 2 : HYDROmorphone 10mg (dix milligrammes) IV/IM pour autoadministration x 1 dose
Surveiller les signes et les symptômes d'intoxication pendant 15 minutes après la dose
Le professionnel de la santé qualifié doit aviser l'utilisateur de l'heure de retour pour la séance 3

Ne pas dépasser 30mg (trente milligrammes) d'HYDROmorphone IM/IV pour la séance 2 du jour 1

Jour 1, séance 3 :

Dose 1 : HYDROmorphone 30mg (trente milligrammes) IV/IM pour autoadministration x 1 dose
Surveiller les signes et les symptômes d'intoxication pendant 15 minutes après la dose

Dose 2 : HYDROmorphone 10mg (dix milligrammes) IV/IM pour autoadministration x 1 dose
Surveiller les signes et les symptômes d'intoxication pendant 15 minutes après la dose
Le professionnel de la santé qualifié doit aviser l'utilisateur de l'heure de retour pour le jour 2

Ne pas dépasser 40mg (quarante milligrammes) d'HYDROmorphone IM/IV pour la séance 3 du jour 1

Jour 2, séance 1 :

Dose 1 : HYDROmorphone 40mg (quarante milligrammes) IV/IM pour autoadministration x 1 dose
Surveiller les signes et les symptômes d'intoxication pendant 15 minutes après la dose

Dose 2 : HYDROmorphone 10mg (dix milligrammes) IV/IM pour autoadministration x 1 dose
Surveiller les signes et les symptômes d'intoxication pendant 15 minutes après la dose
Le professionnel de la santé qualifié doit aviser l'utilisateur de l'heure de retour pour la séance 2

Ne pas dépasser 50mg (cinquante milligrammes) d'HYDROmorphone IM/IV pour la séance 1 du jour 2

Jour 2, séance 2 :

Dose 1 : Si les doses précédentes ont été bien tolérées :
HYDROmorphone 50mg (cinquante milligrammes) IV/IM pour autoadministration x 1 dose
Surveiller les signes et les symptômes d'intoxication pendant 15 minutes après la dose

Dose 2 : HYDROmorphone 10mg (dix milligrammes) IV/IM pour autoadministration x 1 dose
Surveiller les signes et les symptômes d'intoxication pendant 15 minutes après la dose
Le professionnel de la santé qualifié doit aviser l'utilisateur de l'heure de retour pour la séance 3

Ne pas dépasser 60mg (soixante milligrammes) d'HYDROmorphone IM/IV pour la séance 2 du jour 2

Jour 2, séance 3 :

Dose 1 : Si les doses précédentes ont été bien tolérées :
HYDROmorphone 60mg (soixante milligrammes) IV/IM pour autoadministration x 1 dose
Surveiller les signes et les symptômes d'intoxication pendant 15 minutes après la dose

CECI EST UN EXEMPLE D'ORDONNANCE PRÉIMPRIMÉE ADAPTÉE DE LA CLINIQUE CROSSTOWN DE VANCOUVER, C.-B.
CE FORMULAIRE N'EST PAS DESTINÉ À UN USAGE CLINIQUE.

Dose 2 : HYDROmorphone 10mg (dix milligrammes) IV/IM pour autoadministration x 1 dose
Surveiller les signes et les symptômes d'intoxication pendant 15 minutes après la dose
Le professionnel de la santé qualifié doit aviser l'utilisateur de l'heure de retour pour le jour 3

Ne pas dépasser 70mg (soixante-dix milligrammes) d'HYDROmorphone IM/IV pour la séance 3 du jour 2

Jour 3, séance 1 :

Dose 1 : HYDROmorphone 70mg (soixante-dix milligrammes) IV/IM pour autoadministration x 1 dose
Surveiller les signes et les symptômes d'intoxication pendant 15 minutes après la dose

Dose 2 : HYDROmorphone 10mg (dix milligrammes) IV/IM pour autoadministration x 1 dose
Surveiller les signes et les symptômes d'intoxication pendant 15 minutes après la dose
Le professionnel de la santé qualifié doit aviser l'utilisateur de l'heure de retour pour la séance 3

Ne pas dépasser 80mg (quatre-vingts milligrammes) d'HYDROmorphone IM/IV pour la séance 1 du jour 3

Jour 3, séance 2 :

Dose 1 : HYDROmorphone 80mg (quatre-vingts milligrammes) IV/IM pour autoadministration x 1 dose
Surveiller les signes et les symptômes d'intoxication pendant 15 minutes après la dose

Dose 2 : HYDROmorphone 10mg (dix milligrammes) IV/IM pour autoadministration x 1 dose
Surveiller les signes et les symptômes d'intoxication pendant 15 minutes après la dose
Le professionnel de la santé qualifié doit aviser l'utilisateur de l'heure de retour pour le jour 3

Ne pas dépasser 90mg (quatre-vingt-dix milligrammes) d'HYDROmorphone IM/IV pour la séance 2 du jour 3

Jour 3, séance 3 :

Dose 1 : HYDROmorphone 90mg (quatre-vingt-dix milligrammes) IV/IM pour autoadministration x 1 dose
Surveiller les signes et les symptômes d'intoxication pendant 15 minutes après la dose
Le professionnel de la santé qualifié doit aviser l'utilisateur de l'heure de retour à la clinique maintenant que la titration est terminée

Ne pas dépasser 90mg (quatre-vingt-dix milligrammes) d'HYDROmorphone IM/IV pour la séance 3 du jour 3

CECI EST UN EXEMPLE D'ORDONNANCE PRÉIMPRIMÉE ADAPTÉE DE LA CLINIQUE CROSSTOWN DE VANCOUVER, C.-B.
CE FORMULAIRE N'EST PAS DESTINÉ À UN USAGE CLINIQUE.